

減衰振動

<http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/~iwamuro/LECTURE/KIN/>

粘性抵抗の働く振動の運動方程式より、

$$F = ma = -kx - 2\gamma v$$

$$\ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

(但し、 $\gamma \equiv h/m$, $\omega_0^2 \equiv k/m$)

という齊次微分方程式が得られる。

この解を $x = Ce^{\lambda t}$ と置くと、

$$\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$$

$$\lambda = \lambda_{\pm} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

i) $\gamma < \omega_0$ (粘性小) の場合、 $\omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$ として

$$\lambda = -\gamma \pm i\omega$$

$$\begin{aligned} x &= e^{-\gamma t}(Ce^{i\omega t} + \bar{C}e^{-i\omega t}) \\ &= ae^{-\gamma t}\cos(\omega t + \delta) \end{aligned}$$

振幅が指数関数的に減少する状態となる。

この状態を 減衰振動 という。

ii) $\gamma > \omega_0$ (粘性大) の場合、 $\sigma^2 = \gamma^2 - \omega_0^2$ として

$$\lambda = -\gamma \pm \sigma$$

$$x = C_+ e^{-(\gamma-\sigma)t} + C_- e^{-(\gamma+\sigma)t}$$

第2項は早く収束し、収束度は第1項で決まる。

この状態を 過減衰 という。

iii) $\gamma = \omega_0$ の場合 $x = fe^{-\gamma t}$ として書きなおすと

$$\dot{x} = (\dot{f} - \gamma f)e^{-\gamma t}$$

$$\ddot{x} = (\ddot{f} - 2\gamma \dot{f} + \gamma^2 f)e^{-\gamma t}$$

$$\ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = \ddot{f} = 0$$

$$x = e^{-\gamma t}(at + b)$$

粘性抵抗により最も早く振動を収束できる状態。

この状態を 臨界過衰 という。

次に、強制的な加速度 $f_0 \sin \Omega t$ が加わる場合を考える。

$$\ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = -if_0 e^{i\Omega t}$$

ここで、 $\text{Re}(-if_0 e^{i\Omega t}) = f_0 \sin \Omega t$ であり、この非齊次方程式の特殊解を $x = Ce^{i\Omega t}$ と予想して代入する。

$$(-\Omega^2 + 2i\gamma\Omega + \omega_0^2)C = -if_0$$

() 内の複素数を極座標で表すと、

$$(\omega_0^2 - \Omega^2) + 2i\gamma\Omega = \sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2} e^{i\varepsilon}$$

$$\tan \varepsilon = \frac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}, \quad (0 \leq \varepsilon < \pi)$$

となるので、これで C を求めると、

$$C = \frac{-if_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2}} e^{-i\varepsilon}$$

よって特殊解は、

$$\text{Re}(x) = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2}} \sin(\Omega t - \varepsilon)$$

これに左 i)~iii) の一般解のどれかを合わせたものが解となるが、 t が十分に大きくなると上記特殊解のみが残る。振幅が極大となる状態を 共振 (共鳴) という。

$\gamma = 0$ かつ $\Omega = \omega_0$ の場合は振幅が発散するが、
 $x = Cte^{i\omega_0 t}$ と置いて書きなおすと、

$$\dot{x} = C(1 + i\omega_0 t)e^{i\omega_0 t}$$

$$\ddot{x} = (2i\omega_0 - \omega_0^2 t)e^{i\omega_0 t}$$

$$\ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = -if_0 e^{i\Omega t}$$

$$2i\omega_0 C e^{i\Omega t} = -if_0 e^{i\Omega t}$$

$$C = -\frac{f_0}{2\omega_0}$$

よって特殊解は、

$$\text{Re}(x) = -\frac{f_0 t}{2\omega_0} \cos(\omega_0 t)$$

$$= \frac{f_0 t}{2\omega_0} \sin(\omega_0 t - \frac{\pi}{2})$$

減衰のない共鳴では振幅は時間に比例して増大し、運動の位相は外力の位相に対し $\pi/2$ 遅れる。